



## Kyslíkový aktivátor

**přípravek pro použití v kombinaci s kyslíkovým granulátem nebo tabletami  
zabraňuje výskytu řas  
pro krystalicky průzračnou vodu**

### Návod k použití

Ideální hodnota pH: 7,0 - 7,4. Ideální hodnota kyslíku: 5,0 - 8,0 ppm.

**První dávkování:** 100 ml přípravku společně s 200 g Aktivního kyslíku na 10 m<sup>3</sup> vody.

**Následné dávkování:** každý týden 50 ml na 10 m<sup>3</sup> vody (každý týden doplnit 100 g Aktivního kyslíku).

Aktivátor nejprve nadávkujte spolu s přiměřeným množstvím vody do vhodné nádoby a teprve pak pomalu vlévejte do bazénu podél jeho okrajů. Doporučujeme pravidelně kontrolovat hodnotu pH a obsah aktivního kyslíku ve vašem bazénu. Při vysokých teplotách, po bouřkách či intenzivním používání bazénu můžete použít krátkodobě rovněž Chlorový granulát. V případě, že bazén dlouhodobě nepoužíváte, doporučujeme vložit do skimmeru pomalurozpustnou chlorovou tabletu.

Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Při nadýchání: dopravit postiženého na čerstvý vzduch, při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.

Po kontaktu s pokožkou: všeobecně není pro pokožku dráždivý.

Po zasažení očí: oči vyplachujte několik minut pod tekoucí vodou.

Po požití: při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.

Produkt uchovávejte mimo dosah dětí, v uzavřených originálních obalech, chraňte před přímým slunečním zářením při skladování a přepravě.